



ریواییون®

مواد موثر در هر قرص

ویتامین ب۱	۱۰۰ میلی گرم
ویتامین ب۶	۲۰۰ میلی گرم
ویتامین ب۱۲	۲۰۰ میکروگرم

ویتامین های ب۱، ب۶، ب۱۲ از مفید ترین ویتامین های گروه ب برای بدن می باشند.

ویتامین ب۱ با تقویت متابولیسم سبب افزایش انرژی بدن میشود.

ویتامین ب۶ سبب بهبود خلق، کاهش علائم افسردگی و بهبود عملکرد مغز می شود. **ویتامین ب۱۲**

با کمک به ساخت گلبول های قرمز خون به پیشگیری از کم خونی کمک می کند. همچنین مصرف

همزمان **ویتامین ب۱ و ب۱۲** سبب حفظ سلامت سیستم اعصاب و کاهش درد های عصبی به ویژه در

افراد مبتلا به دیابت می شود.

موارد مصرف:

- کمک به سلامت سیستم اعصاب و افزایش سطح انرژی

- این فرآورده مکمل است و برای تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه واکنش های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فرآورده

از مصرف آن خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

پیش از مصرف در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری، مصرف هر نوع دارو به ویژه داروهای ضد صرع مانند

فنی توئین و فنوباریتال، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- مصرف طولانی مدت فرآورده های حاوی مقادیر بالای ویتامین ب۶ ممکن است سبب

بروز نوروپاتی های محیطی شود؛ لذا از مصرف مداوم بیش از یک سال بدون توصیه پزشک

خودداری نمایید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف:

روزانه ۱ عدد قرص همراه غذا با یک لیوان آب میل نمایید.

عوارض جانبی:

- مصرف این فرآورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی شود، اما

ممکن است عوارضی از قبیل تهوع، اسهال، استفراغ، سوزش سر دل، کرامپ شکمی، سر درد،

خواب آلودگی و تکرار ادرار، بروز کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هر گونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش های حساسیتی مصرف این فرآورده را قطع نمایید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

- به دلیل احتمال کاهش جذب ویتامین ب_{۱۲} از مصرف همزمان با برخی داروها مانند نئومايسين، آسپرین، فاموتیدین، امپرازول، داروهای ضد بارداری خوراکی، کلرامفنیکل و کلشیسین خودداری نمایید.

- مصرف همزمان ویتامین ب_{۱۲} با داروی لوودوپا ممکن است سبب کاهش اثرات درمانی این دارو شود؛ لذا از مصرف همزمان خودداری نمایید. مصرف همزمان ویتامین ب_{۱۲} با برخی داروها مانند ایزونیازید، پنی سیلامین و هیدرالازین ممکن است سبب کاهش اثرات مفید این ویتامین در بدن شود.

- مصرف مقادیر بالای الکل در مدت زمان بیش از ۲ هفته ممکن است سبب ممانعت جذب ویتامین ب_{۱۲} شود.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

www.lianpharma.com

