



زینک ۳۰ + مس

مواد موثر در هر قرص

زینک (به صورت گلوکونات)	۳۰ میلی گرم
مس (به صورت گلوکونات)	۱ میلی گرم

خواص مواد تشکیل دهنده:

زینک: از املاح بسیار مفید برای تقویت سیستم ایمنی و سلامت پوست، مو و ناخن ها می باشد؛ زینک به متابولیسم پروتئین های موجود در ساختار پوست از جمله کلاژن که برای بافت پوست ضروری است، کمک می کند. همچنین به دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدانی در جوانسازی پوست نقش دارد. زینک همچنین باعث تولید پروتئین های لازم برای بازسازی درم (لایه عمیق پوست) و خاصیت ارتجاعی آن نیز می شود. این ماده معدنی با سنتز کلاژن و کراتین در حفظ سلامت مو تأثیر گذار است. با سنتز این مواد، رشد مو بیشتر و توده مو متراکم تر می شود.

مس (کوپر) در بدن به همراه آهن به ساخت گلبول های قرمز خون کمک می کند؛ همچنین مس سبب حفظ سلامت استخوان ها، عروق، اعصاب و تقویت سیستم ایمنی می شود. کمبود مس به طور قابل توجهی بر رشد و عملکرد سیستم ایمنی تأثیر می گذارد، ترکیبات موجود در پپتیدهای مس ممکن است سلامت کلی موهای شما را تقویت کند. همچنین مس یکی از ریز مغذی های مورد نیاز برای تولید ملانین بوده و مسئول رنگ موها و همچنین رنگ چشم و پوست شماست.

موارد مصرف:

- کمک به سلامت سیستم ایمنی
- کمک به سلامت پوست، مو و ناخن ها
- این فرآورده مکمل است و برای تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمیباشد.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه واکنش های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

پیش از مصرف در دوران بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت نمایید.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

- در صورت ابتلا به هر گونه بیماری و مصرف هر نوع دارو پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
- مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به نارسایی های کلیوی و کبدی توصیه نمی شود.
مقدار و نحوه صحیح مصرف:
روزانه ۱ عدد قرص همراه با یک لیوان آب میل نمایید.

عوارض جانبی:

- مصرف این فرآورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی شود، اما ممکن است عوارضی از قبیل دل درد، احساس طعم فلزی در دهان، تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه و یا ناراحتی معده بروز کند.
- در صورت بروز و ادامه یافتن هر گونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش های حساسیتی، مصرف این فرآورده را قطع نمایید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

- توصیه می شود ۲ ساعت قبل و ۲ ساعت پس از مصرف این فرآورده از مصرف برخی آنتی بیوتیک ها مانند سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین، تتراسایکلین و داکسی سایکلین و داروی پوکی استخوان مانند آلندرونیت و برخی نوشیدنی ها مانند چای و قهوه به سبب احتمال تداخل در جذب ترکیبات مفید این فرآورده، خودداری نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

www.lianpharma.com

دارنده پروانه ساخت :
شرکت دارویی لیان آسا

