



منیزیم ۲۵۰ + بء

مواد موثر در هر قرص

منیزیم (به صورت اکساید و سیترات) ۲۵۰ میلی گرم
ویتامین بء ۲۰ میلی گرم

خواص مواد تشکیل دهنده :

منیزیم: منیزیم از املاح بسیار مفید برای بدن می باشد که در حفظ عملکرد طبیعی عضلات و رفع اسپاسم های عضلانی، سلامت سیستم قلبی عروقی و استخوان ها نقش اساسی دارد. همچنین به نظر می رسد منیزیم در بهبود میگرن و سردرد های مزمن و بهبود خلق و خو دارای اثرات مفید باشد. قرص سنتروویت* منیزیم ۲۵۰ + بء شرکت دارویی لیان آسا، حاوی ۲۵۰ میلی گرم منیزیم از ملح سیترات و اکساید می باشد که نیاز روزانه بدن شما به این ملح را تأمین می نماید.

ویتامین بء: ویتامین بء نقش کلیدی در سنتز انتقال دهنده های عصبی بازی می کند و از عملکرد حرکتی اعصاب محافظت می نماید. همچنین همراه با منیزیم به بهبود عملکرد سیستم عصبی عضلانی کمک نموده و سبب رفع افسردگی و بهبود خلق می شود.

موارد مصرف:

- کمک به سلامت و تقویت سیستم عصبی و عضلانی.
- کمک به کاهش اسپاسم های عضلانی.
- این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی باشد.

موارد منع مصرف:

- در صورت داشتن سابقه واکنش های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- در دوران بارداری و شیردهی پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- هشدارها و احتیاطات مصرف:**
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری و یا مصرف هر نوع دارو، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- مصرف این فرآورده در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، آریتمی های قلبی و دارای ضربان ساز قلب و بیماری عضلانی میاستنی گراو توصیه نمی شود.
- از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف:

روزانه ۱ عدد قرص همراه با یک لیوان آب میل نمایید.

عوارض جانبی:

- مصرف این فرآورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمیشود اما ممکن است عوارضی از قبیل اسهال، تهوع، درد شکمی و استفراغ بروز پیدا کند. در صورت بروز عوارض گوارشی این فرآورده را بعد از غذا مصرف نمایید.

- در صورت بروز و ادامه یافتن هر گونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش های حساسیتی مصرف این فرآورده را قطع نمایید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

- توصیه می شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف این فرآورده از مصرف برخی آنتی بیوتیک ها (مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین و تتراسایکلین) و داروهای پوکی استخوان و سایر مکمل های حاوی املاح مانند آهن، کلسیم و زینک خودداری نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

