



مگنیویتس[®] - سی وی

مواد مؤثر در هر قرص		
منیزیم (به صورت سیترات)	۱۵۰ میلی گرم	
ویتامین ب _۱	۱۰۰ میلی گرم	
ویتامین ب _۶	۲۰ میلی گرم	
ویتامین ک _۱	۴۵ میکروگرم	
ویتامین ب _{۱۲}	۵ میکروگرم	
ویتامین د _۳	۴۰۰ واحد بین المللی	
فولیک اسید	۴۰۰ میکروگرم	
زینک (به صورت گلوکونات)	۵ میلی گرم	

خواص مواد تشکیل دهنده:

منیزیم: از املاح بسیار مفید برای بدن می باشد که در حفظ عملکرد طبیعی عضلات و رفع اسپاسم های عضلانی، سلامت سیستم قلبی عروقی و استخوان ها نقش اساسی دارد. همچنین به نظر می رسد منیزیم در بهبود میگرن و سردرد های مزمن و بهبود خلق و خو دارای اثرات مفید باشد. قرص مگنیویتس-سی وی[®] حاوی ۱۵۰ میلی گرم منیزیم از ملح سیترات می باشد که جذب مناسب تری نسبت به سایر املاح منیزیم دارد.

ویتامین ب_۱: از عملکرد سیستم عصبی حمایت نموده و از سلول های عصبی در برابر استرس محافظت می نماید. همچنین این ویتامین سبب کمک به کاهش درد و التهاب در بیماران مبتلا به نوروپاتی به ویژه نوروپاتی دیابتیک می شود.

ویتامین ب_۶: نقش کلیدی در سنتز انتقال دهنده های عصبی دارد و از عملکرد حرکتی اعصاب محافظت و هم چنین همراه با منیزیم به بهبود عملکرد سیستم عصبی کمک می نماید.

ویتامین ک_۱: از رسوب کلسیم در جدار عروق پیشگیری می نماید.

فولیک اسید و ویتامین ب_{۱۲}: دارای اثرات حمایتی بر عملکرد سیستم عصبی می باشند.

ویتامین د_۳: با کمک به جذب کلسیم و فسفر در بدن سبب ساخت استخوان ها و افزایش قدرت عضلانی می شود.

زینک: عنصر ضروری برای رشد طبیعی و حفظ سلامت استخوانی بوده و سبب کمک به بهبود برخی گرفتگی های عضلانی می شود.

موارد مصرف:

- کمک به سلامت و تقویت سیستم عصبی و عضلانی
- کمک به کاهش اسپاسم های عضلانی
- این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه واکنش های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری یا شیردهی، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت نمایید.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

- در صورت ابتلا به هر گونه بیماری و یا مصرف هر نوع دارو پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- مصرف این فرآورده در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، آریتمی های قلبی و دارای ضربان ساز قلب و بیماری عضلانی میاستنی گراو توصیه نمی شود.

- از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف:

روزانه ۱ تا ۲ عدد قرص همراه با یک لیوان آب میل نمایید.

عوارض جانبی:

- مصرف این فرآورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمیشود اما ممکن است عوارضی از قبیل اسهال، تهوع، درد شکمی و استفراغ بروز پیدا کند. در صورت بروز عوارض گوارشی این فرآورده را بعد از غذا مصرف نمایید.

- در صورت بروز و ادامه یافتن هر گونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش های حساسیتی مصرف این فرآورده را قطع نمایید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

- توصیه می شود دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصرف این فرآورده از مصرف برخی آنتی بیوتیک ها (مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین و تتراسایکلین) و داروهای پوکی استخوان و سایر مکمل های حاوی املاح مانند آهن، کلسیم و زینک خودداری نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

