



ویتامین ای ۴۰۰

مواد موثر در هر کپسول

ویتامین ای ۴۰۰ واحد
(دی ال - آلفاتوکوفریل استات)

موارد مصرف:

- کمک به تأمین ویتامین ای مورد نیاز بدن و آنتی اکسیدان.

- این فرآورده مکمل است و برای تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت دارا بودن سابقه حساسیت به مشتقات ویتامین ای یا سایر اجزای تشکیل دهنده این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک متخصص و در صورت کمبود ویتامین ای در بدن مادر توصیه می شود.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

- در صورت ابتلا به هرگونه بیماری یا مصرف هر نوع دارو و در دوران بارداری و شیردهی، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- در صورت ابتلا به بیماری هایی از قبیل بیماری های عروقی، دیابت، اختلالات انعقادی خون، بیماری های کلیوی و کبدی، چربی خون بالا و سابقه خون ریزی های گوارشی و جراحی اخیر پیش از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید.

- پیشنهاد می شود مصرف این فرآورده را حداقل یک ماه قبل از اعمال جراحی قطع نمایید.

- از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف:

- روزانه ۱ عدد کپسول و یا طبق نظر پزشک مصرف نمایید.

- کپسول را همراه با غذا و ترجیحاً با کامل ترین وعده غذای روزانه میل نمایید.

- به جهت بلع آسان تر هر کپسول را با مقادیر کافی آب میل نمایید.

عوارض جانبی:

- مصرف این فرآورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی شود. در برخی موارد ممکن است عوارضی از قبیل تهوع، اسهال، دل پیچه، احساس خستگی، سرگیجه، تاری دید و سردرد بروز پیدا کند. در صورت بروز و ادامه یافتن هر گونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش های حساسیتی مصرف این فرآورده را قطع نمایید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

- مصرف همزمان این فرآورده با داروهای دارای اثرات ضد پلاکتی و ضد انعقادی مانند وارفارین، آسپرین و هپارین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (ایبوپروفن، دیکلوفناک و ناپروکسن)، داروهای مهار کننده انتخابی باز جذب سروتونین (مانند فلوکستین، سیتالوپرام و سرتالین) و داروهای گیاهی حاوی سیر و جینکو، به سبب احتمال افزایش اثرات ضد انعقادی و ریسک خونریزی می بایست با احتیاط صورت گیرد.

- به سبب احتمال ایجاد اختلال در جذب ویتامین ای از مصرف همزمان با داروهای اریستات و کلستیرامین خودداری نموده و یا در صورت لزوم این فرآورده را دو ساعت قبل یا بعد از مصرف اریستات مصرف نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

