



CENTROVIT

گلوکزامین ۷۵۰ پلاس

مواد موثر در هر قرص

گلوکزامین سولفات (به صورت پتاسیم کلراید)	۷۵۰ میلی گرم
ام اس ام	۲۰۰ میلی گرم
ویتامین ث	۳۰ میلی گرم
ویتامین د۳	۴۰۰ واحد بین المللی
منگنز (بصورت گلوکونات)	۰/۵ میلی گرم

خواص مواد تشکیل دهنده:

گلوکز آمین ماده ای است که به طور طبیعی در بدن یافت می شود و از مهم ترین نقش های آن در بدن حفظ سلامت غضروف مفاصل از طریق تحریک ساخت برخی مواد در بدن مانند کلاژن می باشد. کلاژن از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده غضروف و مایع بین مفصلی می باشد. مکمل های حاوی گلوکز آمین سولفات اغلب برای کاهش درد و التهاب، کمک به حرکت مناسب و حفظ سلامت مفاصل و یا به تأخیر انداختن روند پیشرفت بیماری های مفصلی مانند آرتروز، آرتروز روماتوئید و پوکی استخوان در این بیماران تجویز می شوند.

ام اس ام، به دلیل دارا بودن اثرات ضد التهابی قابل توجه، سبب کمک به کاهش درد، خشکی و ورم و التهاب مفاصل می شود.

ویتامین د۳ در جذب و متابولیسم کلسیم در بدن نقش اساسی دارد و همراه با **منگنز** سبب کمک به سلامت ساختار و متابولیسم استخوان ها می شود.

ویتامین ث نیز به دلیل دارا بودن اثرات آنتی اکسیدانی با مولکول های التهاب زا در مفاصل مقابله کرده و از موارد مورد نیاز جهت سنتز کلاژن مورد نیاز مفاصل می باشد.

موارد مصرف:

- کمک به سلامت مفاصل و استخوان ها .

- این فرآورده مکمل است و برای تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه واکنش های حساسیتی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فرآورده، از مصرف آن خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی به دلیل نبود اطلاعات علمی کافی توصیه نمی شود.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

- در صورت ابتلا به هر گونه بیماری و یا مصرف هر نوع دارو، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
 - مصرف این فرآورده در افراد مبتلا به دیابت و تحت درمان با داروهای کاهش دهنده قند خون می بایست تحت نظر پزشک متخصص و با کنترل منظم قند خون انجام گیرد.
 - از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید.
 - یک هفته قبل از هر گونه عمل جراحی مصرف این فرآورده را قطع نمایید.
- مقدار و نحوه صحیح مصرف:**
- روزانه ۱ تا ۲ عدد قرص همراه با مایعات کافی مصرف شود.

عوارض جانبی:

- مصرف این فرآورده در مقادیر توصیه شده اغلب سبب بروز عوارض جانبی نمی شود اما ممکن است عوارضی از قبیل ناراحتی گوارشی خفیف مانند تهوع، نفخ، سوزش سر دل، دل درد و اسهال یا یبوست و یا سردرد بروز کند.
- در صورت بروز و ادامه یافتن هر گونه عارضه جانبی و یا بروز واکنش های حساسیتی مصرف این فرآورده را قطع نمایید.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

- از مصرف همزمان با داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین، هپارین و آسپرین خودداری نمایید.
- به سبب احتمال ایجاد اختلال در جذب ویتامین د از مصرف همزمان با داروهای اریستات و کلستیرامین خودداری نموده و یا در صورت لزوم این فرآورده را دو ساعت قبل یا بعد از مصرف اریستات مصرف نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

